

FOGLIO ILLUSTRATIVO DEL PRODOTTO:

IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO SI RIFERISCE A LIQUIDI PREMISCELATI CON NICOTINA (3 mg/ml; 6 mg/ml; 9 mg/ml; 12 mg/ml; 16 mg/ml; 18 mg/ml), UTILIZZABILI CON DISPOSITIVI ELETTRONICI DI VAPORIZZAZIONE.

**ITALIANO**

SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

**CAPACITÀ DI INDURRE DIPENDENZA E TOSSICITÀ:**

PRODOTTO CONTENENTE NICOTINA, SOSTANZA CHE CREA UN'ELEVATA DIPENDENZA. USO SCONSIGLIATO AI GIOVANI ED AI NON FUMATORI. PER EVITARE IL SOVRADOSAGGIO E' CONSIGLIABILE NON UTILIZZARE I LIQUIDI CONTENENTI NICOTINA IN CONCO-

MITANZA CON SIGARETTE TRADIZIONALI, SIGARI, PIPE, CEROTTI, ETC.

**CONTROINDICAZIONI**

QUESTO PRODOTTO NON È INDICATO IN CASO DI: ALLERGIA ALLA NICOTINA O AD ALTRI INGREDIENTI CONTENUTI NEL LIQUIDO;

ASSUNZIONE DI FARMACI CON I QUALI LA NICOTINA

POTREBBE INTERAGIRE O INTERFERIRE;

CONDIZIONI MEDICHE CHE INCLUDONO, MA NON SI

LIMITANO A, MALATTIE CARDIACHE, DIABETE,

IPERTENSIONE, ASMA, MALATTIE EPATICHE O RENALI,

DISTURBI PSICHIATRICI, GASTRITE, ULCERA GASTRICA E/O

REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO;

DUBBI SUL CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO.

**AVVERTENZE PER SPECIFICI GRUPPI A RISCHIO:**

L'USO DEL PRODOTTO NON È RACCOMANDATO NEI SEGUENTI CASI:

SE AVETE MENO DI DICHIOTTO ANNI DI ETÀ;

SE NON SIETE FUMATORI;

SE IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO;

SE SIETE ALLERGICI ALLA NICOTINA O ALLE SOSTANZE PRESENTI NEL PRODOTTO;

IN CASO DI CONCOMITANTE ASSUNZIONE DI ALTRI PRODOTTI

CONTENENTI NICOTINA

(COMPRESSE, GOMME DA MASTICARE, CEROTTI, ECC);

SE SIETE DIABETICI;

SE SOFFRITE DI PATOLOGIE BRONCHIALI O POLMONARI;

SE RITENETE CHE LE VOSTRE CONDIZIONI DI SALUTE NON VI RENDANO IDONEI AL-

L'UTILIZZO DEL PRODOTTO.

**INFORMAZIONI SU EVENTUALI EFFETTI NOCIVI:**

UN'ASSUNZIONE ECCESSIVA DI NICOTINA PUÒ PROVOCARE: NAUSEA, MALESSERE,

VOMITO, VERTIGINI, MAL DI TESTA, DEPRESSIONE; IRRITAZIONE DEL

CAVO ORALE E DELLA GOLA, CONGESTIONE NASALE, BOCCA SECCA,

SENSAZIONE DI SETE, TOSSE, MANCANZA DI RESPIRO; FEBBRE,

DOLORI PETTORALI, TACHICARDIA, ARITMIA. REAZIONI ALLERGICHE,

QUALI ERUZIONI CUTANEE, ORTICARIA, GONFIORE DI VISO, LABBRA,

CAVO ORALE, RESPIRAZIONE DIFFICOLTOSA.

NEL CASO SI MANIFESTASSERO QUESTI, O ALTRI SINTOMI NON

ELENCATI, DURANTE O DOPO L'USO DEL PRODOTTO, CONSULTARE IL

PROPRIO MEDICO O IL PIU' VICINO CENTRO ANTIVELENI.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

IN CASO DI NECESSITÀ, SI SEGNALANO I RECAPITI

TELEFONICI ATTIVI 24 ORE SU 24 DI ALCUNI CENTRI

ANTIVELENI:

CAVP "OSP. PEDIATRICO BAMBINO GESÙ" – ROMA. TEL.

06-68593726

AZ. OSP. UNIV. FOGGIA – FOGGIA. TEL. 0881-732326

AZ. OSP. "A. CARDARELLI" – NAPOLI. TEL. 081-7472870

CAV POLICLINICO "UMBERTO I" – ROMA. TEL. 06-49978000

CAV POLICLINICO "A. GEMELLI" – ROMA. TEL. 06-3054343

AZ. OSP. "CAREGGI" U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA – FIRENZE.

TEL. 055-7947819

CAV CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE

TOSSICOLOGICA – PAVIA. TEL. 0382-24444

OSP. NIGUARDA CA' GRANDA – MILANO. TEL. 02-66101029

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXII – BERGAMO.

TEL. 800-883300

**ISTRUZIONI PER L'USO E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:**

*Note*

I LIQUIDI PER SIGARETTA ELETTRONICA DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO CON VAPORIZZATORI PERSONALI E NON DEVONO ESSERE MISCELATI PER NESSUN MOTIVO CON ALTRI LIQUIDI, CON ALTRE SOSTANZE O MISCELE CON ALTRA DESTINAZIONE D'USO. IL PRODOTTO NON E' DA INTENDERSI COME TERAPIA SOSTITUTIVA PER LA DISASSUEFAZIONE DA NICOTINA. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI, DA MANGIMI, DA BEVANDE. CHIUDERE SEMPRE IL FLACONE DOPO L'UTILIZZO. CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA E DA FONTI DI CALORE. CONSERVARE A TEMPERATURA INFERIORE A 30C. UTILIZZARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA INDICATA IN ETICHETTA.

*Caratteristiche del Flacone*

- LDPE 50% - HDPE 50% (Polietilene a Bassa/Alta Densità) il Flacone, capacità 10ml
- LDPE (Polietilene a Bassa Densità) il Contagocce, inserito nel collo della bottiglia
- HDPE (Polietilene ad Alta Densità) il Tappo. Il tappo è certificato Child Proof / a prova di bambino

*Meccanismo di apertura*

- Non usare il prodotto se il sigillo di garanzia risulta rotto
- Esercitare pressione sul tappo spingendolo verso il basso
- Mantenere la pressione e svitare in senso antiorario
- Prima di riporto, rimettere il tappo esercitando pressione verso il basso ed avvitare in senso orario
- Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso dopo l'uso

*Meccanismo di riempimento del sistema di vaporizzazione*

- Aprire il flacone in linea con il meccanismo sopra descritto
- Inserire il contagocce nel foro di ricarica del sistema di vaporizzazione
- Esercitare una leggera pressione sul flacone in modo da far fuoriuscire il liquido dal contagocce verso il foro di ricarica del sistema di vaporizzazione
- Prima di riporto, rimettere il tappo esercitando pressione verso il basso ed avvitare in senso orario
- Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso dopo l'uso
- Chiudere il foro di ricarica del sistema di vaporizzazione



INFORMATION LEAFLET OF THE PRODUCT

THIS LEAFLET REFERS TO E-LIQUIDS WITH NICOTINE (3 mg/ml; 6 mg/ml; 9 mg/ml; 12 mg/ml; 16 mg/ml; 18 mg/ml), FOR ELECTRONIC CIGARETTES

**ENGLISH**

PLEASE READ CAREFULLY THE LEAFLET WHEN USING THIS PRODUCT.

**ADDICTIVENESS AND TOXICITY:**

THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE, WHICH IS A HIGHLY ADDICTIVE SUBSTANCE. IT IS NOT RECOMMENDED FOR USE BY YOUNG PEOPLE AND NON-SMOKERS. TO AVOID AN OVERDOSE OF NICOTINE IT IS RECOMMENDED NOT TO USE LIQUID CONTAINING NICOTINE AT THE SAME TIME WITH TRADITIONAL CIGARETTES, CIGARS, PIPES, PLASTER, NASAL SPRAY, ETC.

**CONTRA-INDICATIONS**

THIS PRODUCT IS NOT INDICATED:  
IF YOU ARE ALLERGIC TO NICOTINE OR TO OTHER INGREDIENTS CONTAINED IN THE LIQUID;  
IF YOU ARE USING DRUGS WITH WHICH NICOTINE COULD INTERACT OR INTERFERE;  
IN CASE OF MEDICAL CONDITION THAT INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, CARDIAC DISEASES, DIABETES, HYPERTENSION, ASTHMA, HEPATIC OR RENAL DISEASES, PSYCHIATRIC DISORDERS, GASTRITIS, GASTRIC ULCER AND/OR GASTROESOPHAGEAL REFLUX;  
DOUBTS ABOUT CORRECT USE OF THE PRODUCT.

**WARNINGS FOR SPECIFIC GOUPS:**

IF YOU ARE UNDERAGE;  
IF YOU ARE A NON- SMOKER;  
DURING PREGNANCY AND BREAST-FEEDING;  
IF YOU ARE ALLERGIC TO NICOTINE OR TO OTHER SUBSTANCES CONTAINED IN THE LIQUID;  
IN COMBINATION WITH OTHER PRODUCTS CONTAINING NICOTINE (TABLETS, CHEWING GUMS, PATCHES, ETC);  
IF YOU SUFFER FROM DIABETES;  
IF YOU SUFFER FROM A CARDIOVASCULAR OR RESPIRATORY DISEASE;  
IF YOU BELIEVE THAT YOUR GENERAL HEALTH STATUS IS NOT SUITABLE FOR THE USE OF THE PRODUCT.

**POSSIBLE ADVERSE EFFECTS:**

AN EXCESSIVE CONSUMPTION (OVERDOSE) OF NICOTINE MAY CAUSE: NAUSEA, UNWELL, VOMITING, VERTIGO, HEADACHE, DEPRESSION, ORAL CAVITY AND THROAT IRRITATION, NASAL CONGESTION, DRY MOUTH, THIRSTINESS, COUGH, SHORTNESS OF BREATH, FEVER, CHEST PAIN, TACHYCARDIA, ARRHYTHMIA. ALLERGIC REACTION SUCH AS RUSH, URTICARIA (HIVES), SWOLLEN FACE, TONGUE, OR THROAT OR DIFFICULTY BREATHING.

IF THESE SYMPTOMS OCCUR, OR OTHER NON LISTED SIGNS APPEAR, DURING OR AFTER THE USE, THE CONSUMER SHOULD CONSIDER TO DISCONTINUE THE USE OF THE PRODUCT IMMEDIATELY AND CONTACT THEIR PHYSICIAN/DOCTOR OR THE CLOSEST POISON CENTER.

**OTHER INFORMATION**

IF NECESSARY, HERE BELOW THE CONTACT NUMBERS OF SOME POISON CENTERS OPEN 24/24 HOURS:

NHS (ENGLAND AND SCOTLAND) 111.

INSTRUCTIONS FOR USE AND STORAGE OF THE PRODUCTS:

*Notes*

LIQUIDS FOR ELECTRONIC CIGARETTE MUST BE USED ONLY WITH PERSONAL VAPORIZER AND SHOULD NOT BE MIXED WITH OTHER LIQUIDS FOR NO REASON, WITH OTHER MATERIAL OR MIX WITH OTHER DESTINATION USE. THE PRODUCT IS NOT BE INTENDED AS A REPLACEMENT THERAPY FOR NICOTINE CESSATION. KEEP AWAY FROM FOOD, DRINK. ALWAYS CLOSE THE BOTTLE AFTER USE. KEEP AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT AND HEAT SOURCES. STORE AT TEMPERATURES BELOW 30C. USE WITHIN THE EXPIRY DATE INDICATED ON THE LABEL.

*Bottle characteristics*

LDPE 50% - HDPE 50% (Low/HIGH Density Polyethylene) bottle, capacity 10ml

- LDPE (Low Density Polyethylene) dropper, inserted into bottle neck
- HDPE (High Density Polyethylene) child proof cap

*Opening mechanism*

- Do not use if tamper evident seal is broken
- Push down on cap
- Maintain pressure and turn anticlockwise to unscrew
- To replace, screw cap on clockwise until finger tight
- Ensure cap is securely fastened after use

*Refill mechanism*

- Open the bottle in line with the opening mechanism
- Put the dropper inside the refilling hole of the personal vaporizer
- Do a little pressure to let the e-liquid go out of the dropper and go down in the personal vaporizer
- To replace, screw cap on clockwise until finger tight
- Ensure cap is securely fastened after use
- Close the refilling hole of your personal vaporizer

