

PROSPECTO:

ESTE PROSPECTO SE REFIERE A LIQUIDOS CON NICOTINA (3 mg/ml; 6 mg/ml; 9 mg/ml; 12 mg/ml; 16 mg/ml; 18 mg/ml)  
PARA USO EXCLUSIVO CON CIGARRILLOS ELECTRONICOS.

**ESPAÑOL**

LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A USAR ESTE PRODUCTO.

**ADICCIÓN Y TOXICIDAD:**

EL PRODUCTO PUEDE CONTENER NICOTINA EN CONCENTRACIÓN VARIABLE. EL CONTENIDO DE NICOTINA ESTÁ INDICADO EN LA ETIQUETA. LA NICOTINA ES UNA SUSTANCIA ALTAMENTE ADICTIVA. NO SE RECOMIENDA SU CONSUMO A LOS JÓVENES, A LOS MENORES Y A LOS NO FUMADORES.

PARA EVITAR LA SOBREDOSIFICACIÓN DE NICOTINA, SE RECOMIENDA QUE NO USE LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA EN CONEXIÓN CON CIGARRILLOS TRADICIONALES, CIGARROS, PIPAS, PARCHES, ETC.

**CONTRAINDICACIONES**

EL USO DEL PRODUCTO NO ES ACONSEJABLE EN LOS CASOS SIGUIENTES:  
SI USTED ES ALÉRGICO A LA NICOTINA O A OTROS INGREDIENTES CONTENIDOS EN EL LÍQUIDO;  
SI USTED ESTÁ TOMANDO MEDICAMENTOS QUE PUEDAN REACCIONAR CON LA NICOTINA;  
SI USTED PADECE DE ENFERMEDADES QUE INCLUYEN, COMO EJEMPLO Y DE MANERA NO EXHAUSTIVA: ENFERMEDADES CARDÍACAS, DIABETES, HIPERTENSIÓN, ASMA, ENFERMEDADES DEL HÍGADO O RIÑONES, TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS, GASTRITIS, ÚLCERA GÁSTRICA Y/O REFLUJO GASTROESOFÁGICO;  
SI USTED TIENE DUDAS O INCERTEZAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO.

**ADVERTENCIAS A GRUPOS DE RIESGO ESPECÍFICOS**

EL USO DEL PRODUCTO NO ES ACONSEJABLE EN LOS CASOS SIGUIENTES:  
SI USTED TIENE MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD;  
SI USTED NO ES FUMADOR;  
EN CASO DE EMBARAZO Y LACTANCIA;  
SI USTED ES ALÉRGICO A LA NICOTINA O A OTROS INGREDIENTES CONTENIDOS EN EL PRODUCTO;  
SI USTED ESTÁ TOMANDO OTROS PRODUCTOS QUE CONTIENEN NICOTINA (PASTILLAS, CHICLES, PARCHES, ETC.);  
SI USTED ES DIABÉTICO;  
SI USTED PADECE DE ENFERMEDADES BRONQUIALES O PULMONARES;  
SI USTED PADECE PATOLOGÍAS PARA LAS QUE, EN OPINIÓN DE SU MÉDICO, NO ES ACONSEJABLE EL USO DEL PRODUCTO.

**POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:**

UNA ASUNCIÓN EXCESIVA DE NICOTINA PUEDE CAUSAR: Náusea, Malestar, Vértigos, Dolor de Cabeza, Depresión, Irritación de Boca y Garganta, Congestión Nasal, Boca Seca, Sensación de Sed, Tos, Falta de Aliento, Fiebre, Dolor en el Tórax, Taquicardia, Arritmia. REACCIONES ALÉRGICAS COMO ERUPCIONES CUTÁNEAS, URTICARIA, HINCHAZÓN DE CARA, LABIOS, BOCA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR. SI EXPERIMENTA ESTOS O OTROS SÍNTOMAS NO ELENCADOS, DURANTE O DESPUÉS DEL USO DEL PRODUCTO, POR FAVOR CONSULTE UN MÉDICO O EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA MÁS CERCANO.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

EN CASO DE NECESIDAD, SE INDICAN LOS TELÉFONOS DE ALGUNOS CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: +34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas).

Información en español (24h/365 días).

Para más información: [intcf.doc@justicia.es](mailto:intcf.doc@justicia.es) y [intcf@justicia.es](mailto:intcf@justicia.es). Tel. +34 91 768 98 00

**INSTRUCCIONES SOBRE EL USO Y EL ALMACENAMIENTO**

**Notas**

LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS DEBEN USARSE ÚNICAMENTE CON VAPORIZADORES PERSONALES Y NO SE DEBEN MEZCLAR POR NINGÚN MOTIVO CON OTROS LÍQUIDOS, CON OTRAS SUSTANCIAS O MEZCLAS CON CUALQUIER USO. EL PRODUCTO NO DEBE INTENTARSE COMO UNA TERAPIA SUSTITUTIVA PARA EL ABANDONO DE NICOTINA. NO AMANECE EL PRODUCTO EN LA MISMA ÁREA QUE ALIMENTOS O BEBIDAS. MANTENERSE SIEMPRE BIEN CERRADO EL ENVASE DESPUÉS DEL USO. ALMACENAR EL PRODUCTO LEJOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL Y DE LAS FUENTES DE CALOR. ALMACENAR EL PRODUCTO DEBAJO DE 30°C. UTILIZAR DENTRO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN LA ETIQUETA.

**Características de la botella**

- LDPE 50% - HDPE 50% (polietileno de baja densidad/polietileno de alta densidad) el envase, contenido 10ml
- LDPE (polietileno de baja densidad) la boquilla, el Contagocce, insertado en el cuello del envase
- HDPE (polietileno de alta densidad) el tapón. El tapón La tapa está certificado como a prueba de niños.

**Mecanismo de apertura**

- No utilice el producto si el sello de garantía está roto.
- Presionar el tapón hacia abajo.
- Mantener la presión y girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Después la recarga, vuelva a colocar el tapón presionando hacia abajo y girando en el sentido del reloj.
- Asegurarse de que el tapón esté bien cerrado después del uso.

**Mecanismo de llenado del sistema de vaporización.**

- Abrir el envase como descrito anteriormente.
- Insertar la boquilla en el depósito del sistema de vaporización.
- Presione ligeramente el envase para permitir que el líquido fluya desde la boquilla al depósito, llenando el sistema de vaporización.
- Después la recarga, vuelva a colocar el tapón presionando hacia abajo y girando en el sentido del reloj.
- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada después del uso
- Cerrar el orificio de llenado del sistema de vaporización.

